

# L'IRRIGATION TRANSANALE, POUR QUELS PATIENTS?




Dr Egon

Dr Vitton-Hôpital NORD-Marseille

# TROUBLES ANO-RECTAUX

**CONSTIPATION**

**---> DE TRANSIT**




**---> D'EVACUATION (DYSCHESIE)**



**NEUROPATHIE D'ETIREMENT**



**INCONTINENCE ANALE**



# INDICATIONS DE PERISTEEN IRRIGATION TRANSANALE



## Patients...« autres »

- Sclérose en plaque sans troubles locomoteurs
- Maladie de Parkinson
- Diabète (neuropathie diabétique)
- Neuropathie pelvienne post-traumatique / post-partum

## PHYSIOPATHOLOGIE

	<b>SEP</b> 43-68%	<b>M. Parkinson</b> 80%	<b>Diabète</b> 60% / 20%	<b>N postpartum</b> étirement traumatique
Constipation de transit	+	+	+	+
Constipation d'évacuation	+	+		
Incontinence anale	+		+	+
Troubles de la sensibilité rectale	+		+	
Incompétence sphinctérienne	+		+	+

# PRESCRIPTION DE PERISTEEN CHEZ LES PATIENTS « ATYPIQUES »



- Patient à « faible dépendance »
- **Possible en externe +++**
- « Consultation d'éducation » avec une infirmière
- Documents / DVD
- Disponibilité téléphonique
- Suivi systématique à 1 mois

## CONCLUSION



- Problématique de prise en charge des troubles colo-rectaux des patients neurologiques: association constipation/incontinence
- Intérêt de Peristeen +++ chez les patients neurologiques blessés médullaires ou « ambulatoires »
- « Petite » expérience marseillaise satisfaisante chez les patients « ambulatoires »
- Possibilité de prescription en « externe »
  - faciliter la mise en place du traitement
  - « dédramatiser » son utilisation
  - système simple d'utilisation facilitant l'autonomie