

Intégralement remboursé *

	Référence	EAN
Système standard		
<input type="checkbox"/> Système initial (sondes standard) 1 unité de contrôle + 2 sondes rectales + 1 poche à eau + 1 paire d'attaches de jambe	291210	5708932265515
<input type="checkbox"/> Sondes rectales standard 15 sondes rectales + 1 poche à eau	291220	5708932265539
Système court		
<input type="checkbox"/> Système initial (sondes courtes) 1 unité de contrôle + 2 sondes rectales courtes + 1 poche à eau + 1 paire d'attaches de jambe	291260	5708932456920
<input type="checkbox"/> Sondes rectales courtes 15 sondes rectales courtes + 1 poche à eau	291270	5708932456944
Accessoires		
<input type="checkbox"/> Tubulures 2 tubulures avec connecteurs	291250	5708932265591



Peristeen Obtal (tampon obturateur anal)

Boîte de 20 tampons

Intégralement remboursé **

	Diamètre ⁽¹⁾	Référence	EAN
<input type="checkbox"/> ● 37 mm	37 mm	014500	5701780678117
<input type="checkbox"/> ● 45 mm	45 mm	014510	5701780678124

⁽¹⁾ diamètre ouvert



Peristeen Irrigation Transanale: dispositif médical de classe I Fabricant : Coloplast A/S.
Lire attentivement la notice d'instruction avant utilisation.

Les complications de l'irrigation dites graves sont extrêmement rares. Néanmoins, certains cas exceptionnels de perforations anales ont été identifiés suite à la pratique d'irrigation colique. Le patient doit contacter immédiatement son médecin ou un service d'urgences si il ressent, pendant ou après son irrigation, une sensation de malaise ou une douleur importante et prolongée, en particulier si elle s'accompagne de fièvre, d'un saignement anal prolongé.

* Intégralement remboursé dans l'indication troubles colorectaux par atteinte neurologique se traduisant par une constipation et/ou une incontinence fécale chroniques, rebelles au traitement médical bien conduit pour les patients en Affection de Longue Durée (Séc. Soc. 100 %) et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire (Séc. Soc. 60 % + complémentaire 40 %).

La prescription initiale doit être effectuée soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation, soit par un gastroentérologue, soit par un pédiatre. Le médecin traitant pourra prescrire le renouvellement de ce dispositif. Peristeen doit être réservé aux patients ayant reçu une éducation à l'utilisation de ce dispositif, notamment à l'autosondage. Peristeen Système initial (boîte de 1) : prix limite de vente au public 116,84 € TTC, remb. Séc. Soc. 116,84 €. Peristeen Sondes rectales (boîte de 15) : prix limite de vente au public 193,52 € TTC remb. Séc. Soc. 193,52 €. Peristeen Tubulures (boîte de 2) : prix limite de vente au public 19,95 € TTC, remb. Séc. Soc. 19,95 €.

Peristeen Obtal : Dispositif médical de classe IIb, (0543). Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

** Intégralement remboursé dans l'indication incontinence fécale sévère par atteinte neurologique définitive pour les patients en Affection de Longue Durée (Séc. Soc. 100 %) et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire (Séc. Soc. 60 % + complémentaire 40 %) : Peristeen Obtal (boîte de 20) : prix limite de vente au public 72,68 € TTC, remb. Séc. Soc. 72,68 €.

Soins des stomies
Urologie & Continence
Soins des plaies



Coloplast développe des produits et des services afin d'améliorer la qualité de vie des personnes affectées par des troubles intimes. Nous travaillons étroitement avec les utilisateurs de nos produits afin de créer des solutions spécialement adaptées à leurs besoins. Nous appelons cela les soins médicaux intimes. Notre activité concerne les soins des stomies, l'urologie et la continence, ainsi que les soins des plaies. Nous employons plus de 7000 personnes à travers le monde.

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 1299P - Octobre 2013

Laboratoires Coloplast
Les Jardins du Golf
6, rue de Rome
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France
Tél. : 01 56 63 17 00
Fax : 01 56 63 18 07

Score NBD : score fonctionnel digestif des malades neurologiques



Madame, Monsieur,

Cher confrère,

Nous avons le plaisir de vous remettre un outil, le NBD Score* ou score de dysfonctionnement de l'intestin neurologique, développé récemment et validé dans sa version originale pour évaluer l'impact des symptômes colo-rectaux sur la qualité de vie des patients.

L'objectif de cet outil est de vous aider à identifier les patients pouvant relever de l'utilisation de Peristeen® Irrigation Transanale.

Ce questionnaire peut également être utile pour vos patients, lorsqu'il est soumis 2 à 3 mois après l'initiation de ce traitement, pour leur permettre de comparer leur état avant et après recours à l'irrigation colique rétrograde. Ils pourront ainsi mieux juger l'intérêt de cette thérapeutique pour en améliorer l'observance.

Ce questionnaire est simple à soumettre aux patients et peut être auto-administré. Il comporte 10 questions dont la somme des scores permet d'obtenir une note entre 0 et 47 correspondant à l'importance des troubles colo-rectaux ressentis.

Un score supérieur à 10 correspond à une atteinte modérée à sévère et peut justifier l'utilisation de Peristeen Irrigation Transanale.

Nous espérons que ce NBD Score sera un outil utile dans votre pratique,

Bien confraternellement,

Dr Ludovic Garnier
Responsable médical continence

* Krogh K, Christensen P, Sabroe S, Laurberg S. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord 2006;44:625-631

Date : ____/____/____

NOM : _____ Prénom : _____



Score fonctionnel digestif des malades neurologiques¹ (Score NBD)

	Score
1. A quelle fréquence allez-vous à la selle? <input type="radio"/> Chaque jour (score 0) <input type="radio"/> 2 à 6 fois par semaine (score 1) <input type="radio"/> Moins d'une fois par semaine (score 6)	
2. Quel temps passez-vous en moyenne à chaque défécation ? <input type="radio"/> Moins de 30 minutes (score 0) <input type="radio"/> De 30 à 60 minutes (score 3) <input type="radio"/> Plus d'une heure (score 7)	
3. Ressentez-vous une sensation de malaise, des maux de tête ou transpirez-vous au moment de la défécation (signes évocateurs d'hyperréflexie autonome) ? <input type="radio"/> Oui (score 2) <input type="radio"/> Non (score 0)	
4. Prenez-vous des médicaments en comprimés pour la constipation ? <input type="radio"/> Oui (score 2) <input type="radio"/> Non (score 0)	
5. Prenez-vous des médicaments en sachets pour la constipation ? <input type="radio"/> Oui (score 2) <input type="radio"/> Non (score 0)	
6. Avez-vous besoin de mettre le doigt dans l'anus pour aller à la selle ? <input type="radio"/> Moins d'une fois par semaine (score 0) <input type="radio"/> Plus d'une fois par semaine (score 6)	
7. Avez-vous des pertes incontrôlées de selles par l'anus ? <input type="radio"/> Moins d'une fois par mois (score 0) <input type="radio"/> 1 à 4 fois par mois (score 6) <input type="radio"/> 1 à 6 fois par semaine (score 7) <input type="radio"/> Quotidiennes au moins (score 13)	
8. Prenez vous des médicaments pour l'incontinence fécale (perte incontrôlée de selles) ? <input type="radio"/> Oui (score 4) <input type="radio"/> Non (score 0)	
9. Avez-vous des pertes incontrôlées de gaz ? <input type="radio"/> Oui (score 2) <input type="radio"/> Non (score 0)	
10. Avez-vous des problèmes de peau autour de l'anus ? <input type="radio"/> Oui (score 3) <input type="radio"/> Non (score 0)	
Total score (entre 0 et 47)	

Satisfaction générale

Merci d'évaluer votre satisfaction générale concernant votre prise en charge actuelle des troubles colo-rectaux en cochant la case correspondante de l'échelle ci-dessous.
(Mécontentement total - 0 / Grande satisfaction - 10)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Interprétation du score NBD

0 à 6 : Très minime
7 à 9 : Minime
10 à 13 : Modérée
14 et plus : Sévère

Les malades rapportant un score modéré ont trois fois sur quatre un retentissement sur la qualité de vie et ceux rapportant un score important ont un retentissement plus de neuf fois sur dix.

1. Krogh K, Christensen P, Sabroe S, Laurberg S. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord 2006;44:625-631